

Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Stuzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	Fuchsia-Hybriden (Fuchsien) 1. Satz: Stecklinge in Multitopfpplatten später in Endtopf (11/12-er) für Verkauf M.Mai						
1	2	3-4	4	5-6	7	8-14	ab 14	16-18	ab 16	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
E.Jan.	E.Jan	A.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-A.März.	A.März	A.März-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
				Langtag (< 14 h)							<p>Tageslänge: Langtag (Tageslänge > 14 h) für vegetatives Wachstum. Kurztag (< 14 h) zur Förderung der Blütenbildung.</p>					
	Previcur Energy									<p>Wurzelfäule (Pythium, Phytophthora): Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. Tipp: Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. Alternativ kann auch Fonganil angewendet werden.</p>						
	Fonganil									<p>Wurzelfäule (Pythium, Phytophthora): Fonganil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden.</p>						
	Kendo									<p>Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung in Abständen von 5 Tagen wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen. Dadurch wird Lebenszyklus unterbrochen.</p>						
		Actara G Profi								<p>Blattläuse, Weisse Fliegen: 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. Tipp: Wirkt über mehrer Wochen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Flagship hält aber nicht so lange an.</p>						
	NEU	Hicure								<p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelenwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p>						
		Wuxal Suspension Mg								<p>Magnesium-Mangel (= Rote Flecken der Blätter): 0,2 % Spritzen. Tipp: Behandlungen mit Blattdünger bei vollständig bedecktem Himmel oder abends durchführen.</p>						
		Wuxal Profi								<p>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen. Tipp: Giessen über die Pflanze wirkt als Blattdüngung, die die Wurzelbildung fördert die Nährstoffaufnahme erhöht. Dann bei vollständig bedecktem Himmel oder abends giessen.</p>						
		Kendo								<p>Weisse Fliegen, Blattläuse, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % (1 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Netzmittel oder Wuxal Profi verbessern die Wirkung. Nebenwirkung auf Blattwanzen.</p>						
		Plenum WG								<p>Weisse Fliegen, Blattläuse: 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Netzmittel oder Wuxal Profi verbessert die Wirkung. Resistenzmanagement: mit Kendo 0.01 % und Flagship alternieren.</p>						
		Flagship								<p>Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02-0,04 % spritzen. Tipp: Alternative zum Streuen und Einwässern ist Actara G Profi (kein Netzmittel).</p>						
		Plenum WG								<p>Weisse Fliegen, Blattläuse, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Plenum WG 0,04-0,06 % + Kendo 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr breit wirkende Kombination. Gegen Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % dosieren.</p>						
		+ Kendo														

Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Stutzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	Fuchsia-Hybriden (Fuchsien) 1. Satz: Stecklinge in Multitopfpfplatten später in Endtopf (11/12-er) für Verkauf M.Mai						
1	2	3-4	4	5-6	7	8-14	ab 14	16-18	ab 16	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger						
E.Jan.	E.Jan	A.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-A.März.	A.März	A.März-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Schadereger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
		Vertimec									Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung. Gegen Weissen Fliegen Plenum WG 0,06 %.					
		+ Plenum WG														
		Match Profi									Thrips: 0,2 % (20 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.					
		Vertimec									Weichhautmilben, Thrips, Spinnmilben, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Nebenwirkung auf Blattlähchen.					
		Match Profi									Thrips: Match Profi 0,2 % + Vertimec 0,025-0,05 % wiederholt spritzen. Tipp: Netzmittel oder Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.					
		Vertimec														
		Match Profi														
		+ Plenum WG									Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen: Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement Flagship statt Plenum WG.					
		oder														
		+ Flagship														
		Zenar									Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Für Resistenzmanagement alternativ Vertimec der Spritzbrühe zusetzen.					
		+ Etalfix Pro									Zusatz von Netzmittel oder netzenden Blattdüngen Wuxal: Etalfix Pro 0,02 % oder Wuxal Profi 0,2 % der Spritzbrühe zusetzen. Tipp: Bei Zusatz von Blattdünger Spritzung nur abends oder bei vollständig bedecktem Himmel. Blattdünger wirken vitalisierend auf die Blätter und fördern auch die Aktivität und Nährstoffaufnahme der Wurzeln.					
		oder														
		+ Wuxal Profi														
		Play									Botrytis-Stängelfäule, Graufäule der Blätter: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen und Pflanzen gut besprühen. Tipp: Klimaführung für schnelles Abtrocknen nutzen. Resistenzmanagement: Mit Mapro alternieren.					
		Indar 5 EW									Blattflecken, Fuchsien-Rost: 0,15 % + Dithane NeoTec 0,3 % spritzen. Tipp: Resistenzmanagement -> alternieren mit Tega.					
		Dithane NeoTec														

Stecken	Wurzelbildung	Wachstum	Topfen	Wachstum	Stuzen	Wachstum	Blühbeginn	Verkauf	Pflanzbeete	Fuchsia-Hybriden (Fuchsien) 1. Satz: Stecklinge in Multitopfplatten später in Endtopf (11/12-er) für Verkauf M.Mai						
1	2	3-4	4	5-6	7	8-14	ab 14	16-18	ab 16	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
E.Jan.	E.Jan	A.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-A.März.	A.März	A.März-M.Mai	M.Mai	ab Mai	ab Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
		Score Profi									Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.					
		Tega									Fuchsien-Rost, Graufäule: Tega 0,05 % spritzen. Tipp: Kein Netzmittel zusetzen. Mit Indar 5 EW + Dithane NeoTec alternieren. Max. 3 Anwendungen.					
		Topas									Echter Mehltau: 0,025 % spritzen. Tipp: Resistenzere Sorten bevorzugen.					
		Nimrod									Echter Mehltau: 0,1-0,2 % spritzen. Blühende Pflanzen 0,1 % spritzen. Tipp: Blühende Pflanzen nur leicht betauen.					
			Plantomaag Mix								Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					
				Bonzi							Wachstumsregulierung: 0,5-0,6 % spritzen. Tipp: Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen. Damit bessere Verzweigung und mehr Seitentriebe.					