

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Flüssiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai
KV	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
M	M. Febr.	M. Febr.	M. Febr.-E. Febr.	E. Febr.	E. Febr.-M. Apr.	E. Apr.	ab E. Apr.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
		Previcur Energy		Previcur Energy				Vermehrungspilze, Wurzelpilze: Previcur Energy 0,25 % giessen, sofort nach der Saat. Tipp: Nach Durchwurzelung wiederholt giessen mit 0,15 %. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau. Alternativ kann auch Fonganiil angewendet werden.
		Fonganiil		Fonganiil				Vermehrungspilze, Wurzelfäule: Fonganiil 0,02 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Alternativ kann Previcur Energy gegossen werden. Schützt auch vorbeugend gegen Falschen Mehltau.
		Play						Graufäule: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Nicht zu tief pikieren bzw. topfen. Blätter sind sehr empfindlich und anfällig für Botrytis.
			Actara G Profi					Blattläuse, Weisse Fliegen: 1 g/l Substrat 1 Woche nach dem Topfen streuen. Nach dem Streuen Granulat einwässern. Tipp: Wirkt über mehrere Wochen. Alternative zum Streuen und Einwässern ist Flagship hält aber nicht so lange an.
			Kendo					Trauermücken und -larven: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen / Lebenszyklus unterbrochen ist.
		NEU	Hicure					Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.
				Plantomaag Normal oder Plantomaag Mix 4M				Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
				Vertimec				Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips, Weisse Fliegen: 0,025 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel / Blattdünger Wuxal Profi verbessert die Wirkung.
				Zenar				Spinnmilben: 0,04 % spritzen. Tipp: Alternativ für Resistenzmanagement Vertimec einsetzen.
				Vertimec + Etafix Pro				Spinnmilben, Weichhautmilben, Thrips: 0,025 % + Etafix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag (nur im Gewächshaus) anwenden. Netzmittel verbessert die Wirkung.

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Flüssiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai						
KW	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
M	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Feb.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
					Match Profi			Thrips, Blattläuse und Weisse Fliegen: Match Profi 0,2 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind. Resistenzmanagement Flagship statt Plenum WG.						
					+ Plenum WG									
					oder			Blattläuse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Thrips: 0,01 % spritzen. Tipp: Substratoberfläche gut benetzen. Anwendung wiederholen bis keine Adulten mehr auffliegen und Lebenszyklus unterbrochen ist.						
					+ Flagship									
					Kendo			Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Resistenzmanagement: Alternativ kann Kendo 0,01 % eingesetzt werden.						
					Plenum WG			Blattläuse, Weisse Fliegen: 0,02-0,04 % spritzen. Tipp: Alternative zum streuen und einwässern ist Actara G Profi.						
					Flagship			Blattläuse, Weisse Fliegen, Thrips, Spinnmilben und Minierfliegen: Vertimec 0,025 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Mischung mit sehr breiter Wirkung. Weisse Fliegen mit Plenum WG 0,06 %.						
					Vertimec			Blattläuse und Weisse Fliegen: Etalfix Pro 0,02 % + Plenum WG 0,04-0,06 % spritzen. Tipp: Weisse Fliegen Plenum WG 0,06 % in den frühen Morgenstunden anwenden wenn sie weniger beweglich sind und besser getroffen werden können. Netzmittel Etalfix Pro verbessert zusätzlich die Wirkung.						
					+ Plenum WG									
					Etalfix Pro			Falscher Mehltau: Fonganiil 0,02 % + Dithane NeoTec 0,3 % spritzen. Tipp: Für optimalen Schutz früh beginnen und allenfalls Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % zusetzen gegen Spritzflecken.						
					+ Plenum WG									
					oder			Falscher Mehltau, Graufäule: Tega 0,05 % spritzen. Tipp: Kein Netzmittel zusetzen. Andere Wirkstoffgr. als Fonga./Dithan.						
					+ Flagship									
					Fonganiil			Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.						
					+ Dithane NeoTec									
					Tega									
					Wuxal Profi									

	Saat	Keim- ung	Wachstum	Pikieren bzw. Topfen	Wachstum	Blüh- beginn	Verkauf	Impatiens walleriana (Fleissiges Lieschen) 8-er-Topf für Verkauf A.Mai							
KW	1	2	3-4	4	5-9	10	11	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
M	M.Febr.	M.Febr.	M.Febr.-E.Febr.	E.Febr.	E.Febr.-M.Apr.	E.Apr.	ab E.Apr.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp							
					Wuxal Suspension Mg			Blattdünger gegen latenten oder akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten spritzen.							
					Wuxal Suspension Mn			Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.							
					Alar		Wachstumsregulierung: 0,3 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind und bei beginnendem Längenwachstum. Evtl. wiederholen. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.								
					Bonzi		Wachstumsregulierung: 0,1-0,15 % spritzen. Tipp: Auf wüchsige Pflanzen behandeln.								
						Play		Blütenbotrytis: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen.							
						+ Etalfix Pro		Tipp: Ab Blüte Etalfix Pro 0,02 % zumischen damit es sicher keine Spritzflecken gibt.							