

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
				Fonganiil									Prunus laurocerasus (Kirschlorbeer)
			NEU	Hicure									<p>Stammgrundfäule (<i>Phytophthora cactorum</i>): Jungpflanzen mit 0,02 % vor dem Topfen tauchen oder nach dem Topfen wiederholt giessen. Tipp: Anwendung nur bei Kultur im Tunnel / Treibhaus. Trockenes Substrat vor Behandlung giessen.</p> <p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p> <p>Eisen-Mangel: 10-20 g/m² streuen, einarbeiten und einwässern. Tipp: Stark kalkhaltige Böden für Kirschlorbeerhecken meiden. Mischbar mit Wuxal Profi.</p> <p>Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen beigegeben. Fördert Blattgrün. Nicht in die Blüten.</p> <p>Eulenraupen, Gespinstmotten, Spanner und Trägspinner: 0,02 % spritzen bei Auftreten. Tipp: Nebenwirkung auf Miniermotten.</p> <p>Blattläuse: 0,05 % spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bei min. 10 °C spritzen. Massenvermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustriebs-spritzung sinnvoll (siehe oben). Alternieren mit Pirimor oder Perfekthion.</p> <p>Blattläuse: 0,04 % spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bei min. 10 °C spritzen. Massen-vermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustrieb-spritzung mit Genol Plant oder SanoPlant Winteröl. Alternieren mit Plenum WG.</p> <p>Blattläuse, Thripse, Gespinstmotten: 0,1 % bei ersten Auftreten spritzen. Tipp: Dringt ins Blatt ein. Anwendung ausserhalb Bienenflug.</p> <p>Echter Mehltau, Schrotschuss (<i>Stigmia carpophila</i>): 0,2 % auf junge Triebe spritzen. Tipp: Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen. Alternierend mit Indar 5 EW oder Cuprofix behandeln.</p> <p>Echter Mehltau, Schrotschuss (<i>Stigmia carpophila</i>), Blattfleckenpilze (<i>Cercospora, Coryneum, Phyllosticta, Trochila</i>), Spitzen- und Zweigdürre (<i>Monilia laxa</i>): 0,02 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen.</p> <p>Echter Mehltau, Schrotschuss, Blattfleckenpilze (<i>Cercospora, Coryneum, Phyllosticta, Trochila</i>): 0,08 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Keine Netzmittel zusetzen. Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen.</p>
				Sequestrene Rapid									
				Wuxal Suspension Mg									
				Dimilin SC									
				Plenum WG									
				Pirimor									
				Perfekthion									
				Nimrod									
				Score Profi									
				Tega									

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
				Delan 500 SC										Prunus laurocerasus (Kirschlorbeer)	
				Delan 500 SC											Blattflecken allg., Schrotschuss: Vorbeugend 0,075 % spritzen. Tipp: Alternativ Behandlung mit Cuprofix.
				+ Indar 5 EW											Blattflecken allg., Echter Mehltau, Schrotschuss: Tankmischung Delan 500 SC 0,05 % + Indar 5 EW 0,2 % spritzen. Tipp: Mehrere Behandlungen alle 2-3 Wochen. Wirkt vorbeugend und abstoppend.
				Dithane NeoTec					Dithane NeoTec					Blattfleckenpilze, Schrotschuss (<i>Stigmia carpophila</i>): 0,3 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Ende März behandeln. Tipp: Tankmischung mit netzendem Wuxal Profi möglich. Dadurch entstehen weniger Spritzflecken.	
				+ Wuxal Profi					+ Wuxal Profi						
				Touchdown System 4										Blacken, Hahnenfuss und Schachtelhalm: Touchdown System4 1 % + Duplosan KV Combi 1 % gleichmässig spritzen. Tipp: Nur Unkräuter behandeln. Abdrift mit Spritzschirm sicher vermeiden.	
				+ Duplosan KV Combi											
				Duplosan KV Combi										Milch- oder Mattdisteln: Duplosan KV Combi 1 % + Etalfix Pro 0,02 % gleichmässig spritzen. Tipp: Nur Unkräuter behandeln. Abdrift mit Spritzschirm sicher vermeiden.	
				+ Etalfix Pro											
				Lontrel 100										Ackerkratzdisteln, Milch- oder Mattdisteln, Aufrechtes Traubenkraut: Lontrel 100 0,3 % + Genol Plant 0,5 % gleichmässig spritzen. Tipp: Nur Unkräuter behandeln. Abdrift mit Spritzschirm sicher vermeiden.	
				+ Genol Plant											
									Goal					Alle Unkräuter: 20 ml/Are in 10 l Wasser gleichmässig spritzen. Tipp: Alle Herbizide mit Kontaktwirkung dürfen nur in gut verholzten Kulturen (ab September) angewendet werden.	