

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
			Fongamil									Koniferen allgemein
			Cuprofix oder Cuprofix Fluid oder Dithane Neotec									<p>Stammgrundfäule: Jungpflanzen von Scheinzypresse oder Wacholder mit 0.02 % (2 ml/10 l Wasser) vor dem Topfen tauchen oder nach dem Topfen wiederholt giessen. Tipp: Anwendung nur bei Kultur im Tunnel / Treibhaus. Trockenes Substrat vor Behandlung giessen.</p> <p>Dothistroma-Nadelbräune der Föhre / Rotbandkrankheit: Cuprofix 0,3 %, Cuprofix Fluid 0,1 % oder Dithane Neotec 0,3 %. Jeweils mit Zusatz von Wuxal Profi 0,2 %. Tipp: Ab April 2-3 mal behandeln. Abgefallene Nadeln entsorgen, sehr stark befallene Föhren entfernen und der Verbrennung zuföhren. In der Schweiz sind nahezu ausschliesslich Bergföhren (vereinzelt Schwarzföhren) im Garten- und Parkbereich betroffen. <i>Rotbandkrankheit und Braunfleckenkrankheit sind meldepflichtig: Meldungen bitte an Waldschutz Schweiz, WSL, 8903 Birmensdorf oder an den Kantonalen Pflanzenschutzdienst.</i></p>
												<p>Lecanosticta-Nadelbräune der Föhre / Braunfleckenkrankheit: Derzeit keine Produkte zur direkten Bekämpfung bewilligt. Abgefallene Nadeln entsorgen, befallene Föhren entfernen und der Verbrennung zuföhren. In der Schweiz sind nahezu ausschliesslich Bergföhren im Garten- und Parkbereich betroffen. Tipp: <i>Rotbandkrankheit und Braunfleckenkrankheit sind meldepflichtig: Meldungen bitte an Waldschutz Schweiz, WSL, 8903 Birmensdorf oder an den Kantonalen Pflanzenschutzdienst.</i></p>
			Kendo									<p>Fichtenröhrenläuse, Sitkafichtenlaus, Tannentrieblaus: 0,05 % spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bei min. 10 °C spritzen. Massenvermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustriebsspritzung sinnvoll (siehe oben). Alternieren mit Pirimor, Kendo oder Perfekthion.</p>
			Plenum WG									<p>Fichtenröhrenläuse, Sitkafichtenlaus, Tannentrieblaus: 0,01 % spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bereits ab 5 bis maximal 23°C spritzen. Massenvermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustriebsspritzung sinnvoll (siehe oben). Alternieren mit Pirimor, Plenum WG oder Perfekthion.</p>
			Pirimor									<p>Fichtenröhrenläuse, Sitkafichtenlaus: 0.04 % spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bei min. 10 °C spritzen. Massenvermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustriebsspritzung mit Genol Plant oder SanoPlant Winteröl. Alternierend mit Plenum WG, Perfekthion oder Kendo anwenden.</p>
			Perfekthion									<p>Blattläuse allgemein: 0,1 % bei ersten Auftreten spritzen. Tipp: Spritzung Blautanne Mitte April, Lebensbaum im Mai (nach 10 Tagen wiederholen) oder Föhre von Mai bis Juni. Bei Mehrfachbehandlung mit Plenum WG alternieren.</p>

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Koniferen allgemein
			Delan 500 SC									<p>Gitterrost: Wacholder mit Tankmischung Delan 500 SC 0,05 % + Indar 5 EW 0,2 % spritzen. Tipp: Mehrere Behandlungen alle 2-3 Wochen. Wirkt vorbeugend und abstoppend.</p> <p>Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abspülen um Verbrennungen zu vermeiden.</p> <p>Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in Blüten.</p> <p>Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.</p> <p>Triebsterben der Föhre: Delan WG 0,05 %. Tipp: Mitte April bis Anfang Mai ist die beste Zeit zur Behandlung. Alternativ Behandlung mit Cuprofix.</p> <p>Triebsterben der Föhre: Delan 500 SC 0,05 %. Tipp: Mitte April bis Anfang Mai ist die beste Zeit zur Behandlung. Alternativ Behandlung mit Deland WG oder Cuprofix.</p> <p>Triebsterben der Föhre: Cuprofix 1,0 %. Tipp: Beste Behandlungszeit ist Mitte April bis Anfang Mai. Alternativ Behandlung mit Dithane NeoTec.</p> <p>Triebsterben der Föhre: Cuprofix 0,5 %. Tipp: Beste Behandlungszeit ist Mitte April bis Anfang Mai. Alternativ Behandlung mit Dithane NeoTec.</p> <p>Botrytis und Sklerotinia in Christbaumkulturen: Play 0,12 % + Plenum WG 0,04 % + Wuxal Profi 0,2 % spritzen. Behandlung Ende April und Mitte Mai. Tipp: Wuxal Profi als Blattdüngung vitalisiert die Nadeln und dient als Netzmittel um Verteilung und so Wirkung zu verbessern. Statt Plenum WG kann alternativ Pirimor und statt Wuxal Profi kann das Netzmittel Etalfix Pro verwendet werden.</p> <p>Botrytis und Sklerotinia in Christbaumkulturen: Play 0,12 % + Plenum WG 0,04 % + Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Behandlung Ende April und Mitte Mai. Tipp: Wuxal Profi als Blattdüngung vitalisiert die Nadeln und dient als Netzmittel um Verteilung und so Wirkung zu verbessern. Statt Plenum WG kann alternativ Pirimor und statt Etalfix Pro Blattdünger Wuxal Profi verwendet werden.</p> <p>Blattflecken allgemein, Rost, Nadelbräune und Zweigsterben (Kabatina): 0,05 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Lokalsystemisch, für optimales Eindringen mindestens 10 °C nötig.</p>
			+ Indar 5 EW									
			Sequestrene Rapid									
			Wuxal Suspension Mg									
			Wuxal Suspension Mn									
		NEU	Delan WG									
			Delan 500 SC									
			Cuprofix Fluid									
			Cuprofix									
			Play									
			+ Plenum									
			+ Wuxal									
			Play									
			+ Plenum									
			+ Etalfix Pro									
			Score Profi									

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
					Dithane								Koniferen allgemein
					Cuprofix Fluid								Nadelbräune und Zweigsterben (Kabatina): 0,4 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Tankmischung mit Wuxal Profi möglich. Siehe Föhrenschütte.
					Cuprofix								Nadelbräune und Zweigsterben (Kabatina): 0,6 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Tankmischung mit Wuxal Profi möglich. Siehe Föhrenschütte.
							Dithane						Nadelbräune und Zweigsterben (Kabatina): 0,3 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Tankmischung mit Wuxal Profi möglich. Siehe Föhrenschütte.
							+ Wuxal Profi						Föhrenschütte: Dithane NeoTec 0,4 % + Wuxal Profi 0,2 % spritzen. Behandlung Ende Juli bis Anfang August sowie Anfang September. Tipp: Wuxal Profi als Blattdüngung vitalisiert die Nadeln und dient als Netzmittel um Verteilung und so Wirkung zu verbessern.
									Goal				Ausdauernde Unkräuter in Christbaumkulturen: 20-40 ml/Are in 10 l Wasser gleichmässig spritzen. Tipp: Alle Herbizide mit Kontaktwirkung dürfen nur in gut verholzten Kulturen (ab September) angewendet werden.
									Divopan				Ausdauernde Unkräuter in Christbaumkulturen: 0,4 % gleichmässig spritzen. Tipp: Alle Herbizide mit Kontaktwirkung dürfen nur in gut verholzten Kulturen (ab September) angewendet werden.