

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
												Laubgehölze allgemein
												Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger
												Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
												<p>Quecken, Gräser, Ausfallgetreide und einjährige Unkräuter: 25–40 ml/Are (2,5–4,0 l/ha) gegen einjährige Unkräuter und Ungräser wie Raygras, Rispengras, Honiggras, Hirsearten und andere Gräser sowie gegen Vogelmiere, Knöterich und Ehrenpreis. 50–62,5 ml/Are (5,0–6,25 l/ha) gegen Quecken. Brühmenge: mit dem Spritzbalken 500–1000 l/ha, mit der Giesskanne 50–100 l/100 m². Tipp: Besonders gut wirksam bei Temperaturen < 10 °C. Ideal zur Anwendung ausserhalb der arbeitsintensiven Zeit.</p>
												<p>Überwinternde Schädlinge, Spinnmilben- und Blattläuseier, Wollläuse, Schildläuse, Knospengallmilben: 2 % (0,2 l/10 l Wasser). Tipp: Oder Alternative SanoPlant Winteröl. Zusatz Cuprofix gegen Pilzkrankheiten.</p>
												<p>Überwinternde Pilzkrankheiten, Schorf: Cuprofix Fluid 0,4 % oder Cuprofix 0,2 % spritzen, spätestens zum Knospenschwellen. Tipp: SanoPlant Winteröl ist Alternative für kleine Spritzbrühmengen.</p>
												<p>Moos und Lebermoos in Kontainerculturen: 0,75 % (75 g/Are in 10 l Wasser) spritzen. Tipp: Moos und Lebermoos gut benetzen.</p>
												<p>Monilia (Forsythia, Steinobst), Botrytis: 0,05 % (= halbe Dosierung) spritzen. Tipp: Behandlung Forsythien bei Blütebeginn und 10 Tage später. Wirkung gegen Blütenknospenfäule.</p>
												<p>Blattbräune (Guignardia): Indar 5 EW 0,2 % + Dithane NeoTec 0,2 % spritzen. Tipp: Beim Austreiben der Knospen 2-3 Behandlungen durchführen.</p>
												<p>Stammgrundfäule (<i>Phytophthora cactorum</i>), Clematissterben: 0,02 % wiederholt giessen. Tipp: Anwendung nur bei Kultur im Tunnel / Treibhaus. Trockenes Substrat vor Behandlung giessen.</p>
												<p>Stammgrundfäule (<i>Phytophthora cactorum</i>), Clematissterben: 0,15 % wiederholt giessen. Tipp: Trockenes Substrat vor Behandlung giessen verbessert die Wirkung.</p>
												<p>Gräser und Hirsen: 0,15 % spritzen mit 5-6 l Spritzbrühe/Are. Tipp: Gräser leicht betauen. Bei erneutem Auflaufen wiederholen.</p>
												<p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelenwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p>

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
													Laubgehölze allgemein		
			Wuxal Profi											<p>Blattdünger, Netzmittel: 0,2 % spritzen. Tipp: Allen Spritzungen zusetzen. Verbessert die Benetzung und vitalisiert die Blätter.</p>	
			Perfekthion											<p>Blattläuse, Thripse, Gespinstmotten: 0,1 % bei ersten Auftreten spritzen. Tipp: Dringt ins Blatt ein. Noch bei hohen Temperaturen wirksam (12-28 °C). Anwendung ausserhalb Bienenflug. Alternative Plenum WG nicht bienengefährlich. Gespinstmotten an Zier-Prunus beim Aufblühen und 10 Tage später Behandlung auf junge Triebe wiederholen.</p>	
			Cuprofix Fluid										<p>Blattfleckenkrankheiten, Falscher Mehltau (Parthenocissus): Vorbeugend behandeln mit 0,6 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen. Trockene Pflanzen behandeln. Tipp: Während regnerischen Wetterphasen Spritzintervalle auf 2 Wochen verkürzen. Platanen 2-3 mal ab Austrieb spritzen.</p>		
			Cuprofix										<p>Blattfleckenkrankheiten, Falscher Mehltau (Parthenocissus): Vorbeugend behandeln mit 0,3 % wiederholen im Abstand von 2-3 Wochen. Auf trockene Pflanze spritzen. Tipp: Während regnerischen Wetterphasen Spritz-intervalle auf 2 Wochen verkürzen. Platanen 2-3 mal ab Austrieb spritzen.</p>		
			Plantomaag Normal				oder				Plantomaag Mix 4M/6M				<p>Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m³, normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m³. Plantomaag Mix 4M/6M zur Nachdüngung von Containerpflanzen: Plantomaag® Mix zwischen Contaierrand und Stamm auf Substrat streuen. Idealer Zeitpunkt: März bis Mai. für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.</p>
				Thiovit Jet										<p>Echter Mehltau, Schrotschuss (<i>Stigmia carpophila</i>): Vorbeugend 0,1-0,2 % ab Ende März mehrmals alle 2-3 Wochen spritzen. Bei erstem Befall Behandlungsabstand auf 7 Tage verringern. Tipp: Bei Neuaustrieb Dosierung max. 0,1 %. Nicht bei Hitze (> 25 °C) anwenden. Sorten mit geringerer Anfälligkeit bevorzugen.</p>	
				Insegar DG										<p>Napfschildläuse: 0,04 % spritzen bei Auftreten. Tipp: Behandlung während der Überwinterung von Kübelpflanzen nur im Treibhaus.</p>	
				Vertimec										<p>Spinnmilben all., Thrips, Weichhautmilben, Minierfliegenlarven: 0,025 % spritzen. Tipp: Alternieren mit Zenar. Minierfliegenlarven A. und M.Juni.</p>	
				Zenar										<p>Spinnmilben all.: 0,04 % spritzen bei Schlupf der Milben im April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Alternieren mit Vertimec. Linde nach der Blüte spritzen.</p>	
				Dimilin SC										<p>Eulenraupen, Gespinstmotten, Spanner und Trägspinner: 0,02 % spritzen bei Auftreten. Tipp: Nebenwirkung auf Miniermotten.</p>	
				Sequestrene Rapid										<p>Eisen-Mangel: 10-20 g/m² streuen, einarbeiten und einwässern. Tipp: Stark kalkhaltige Böden für Kirschlorbeerhecken meiden. Mischbar mit Wuxal Profi.</p>	

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
				Wuxal Suspension Mg										Laubgehölze allgemein
				Wuxal Suspension Ca										Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.
				Wuxal Suspension Mn										Blattdünger gegen Ca-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen. Tipp: Für Zierapfel damit die Früchte lange Fleckenlos bleiben mit Schorfbekämpfung Score Profi kombinieren.
				Kendo										Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.
				Plenum WG										Blattläuse, Blattkäfer, Dickmaulrüssler (adulte): 0,01 % bei Temperaturen von 5-23 °C spritzen. Tipp: Gegen Dickmaulrüssler bei Dämmerung behandeln da sie nachtaktiv sind. Mit Plenum WG mischbar. Nebenwirkung auf Raupen.
				Pirimor										Blattläuse: 0,05 % spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bei min. 10 °C spritzen. Massen-vermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustriebsspritzung sinnvoll (siehe oben). Alternieren mit Pirimor oder Perfekthion.
				Indar 5 EW										Blattläuse: 0,04 % (4 ml/10 l Wasser) spritzen von Anfang bis Mitte April oder bei späterem Auftreten. Tipp: Für optimale Wirkung bei min. 10 °C spritzen. Massen-vermehrung der Läuse erfolgt während milden Wintern. Deshalb Winteraustrieb-spritzung mit Genol Plant oder SanoPlant Winteröl. Alternieren mit Plenum WG.
				Score Profi										Schwarzflecken (Acer), Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheiten, Rost, Weiden-Schorf: Indar 5 EW 0,2 % (20 ml/10 l Wasser) spritzen. Tipp: Alternative Dithane NeoTec. In Hortensien ist Tankmischung mit Plenum WG sehr arbeitssparend wenn Blattläuse vorhanden sind. Blattflecken der Linde ab Austrieb spritzen. Blattflecken des Schneeballs im Vorsommer 2 mal bekämpfen. Rost und Blattflecken an Populus ab M.Juni behandeln.
				Tega										Echter Mehltau, Schrotschuss (Stigmia carpophila), Blattfleckenpilze (Cercospora, Coryneum, Phyllosticta, Trochila), Spitzen- und Zweigdürre (Monilia laxa) sowie Schorf an Zieräpfeln: 0,05 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen.
			NEU	Delan WG										Echter Mehltau, Schrotschuss, Blattfleckenpilze (Cercospora, Coryneum, Phyllosticta, Trochila): 0,08 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Mai behandeln. Tipp: Keine Netzmittel zusetzen. Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen.
														Blattflecken allg., Schrotschuss: Vorbeugend 0,05 % spritzen. Tipp: Alternativ Behandlung mit Delan 500 SC 0,075 % oder Cuprofix.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
			<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Delan WG</div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">+ Indar 5 EW</div>									<p>Laubgehölze allgemein</p> <p>Blattflecken allg., Echter Mehltau, Schrotschuss: Tankmischung Delan WG 0,05 % + Indar 5 EW 0,2 % spritzen. Tipp: Mehrere Behandlungen alle 2-3 Wochen. Wirkt vorbeugend und abstoppend. Alternativ kann auch Delan 500 SC 0,05 % verwendet werden.</p> <p>Blattfleckenpilze, Schrotschuss (<i>Stigmia carpophila</i>): 0,3 % mehrmals im Abstand von 2-3 Wochen ab Ende März behandeln. Tipp: Tankmischung mit netzendem Wuxal Profi möglich. Dadurch weniger Spritzflecken.</p> <p>Blacken, Hahnenfuss und Schachtelhalm: Touchdown System4 1 % + Duplosan KV Combi 1 % gleichmässig spritzen. Tipp: Nur Unkräuter behandeln. Abdrift mit Spritzschirm sicher vermeiden.</p> <p>Milch- oder Mattdistel: Duplosan KV Combi 1 % + Etafix Pro 0,02 % gleichmässig spritzen. Tipp: Nur Unkräuter behandeln. Abdrift mit Spritzschirm sicher vermeiden.</p> <p>Ackerkratzdisteln, Milch- oder Mattdistel, Aufrechtes Traubenkraut: Lontrel 100 0,3 % + Genol Plant 0,5 % gleichmässig spritzen. Tipp: Nur Unkräuter behandeln. Abdrift mit Spritzschirm sicher vermeiden.</p> <p>Blattfleckenkrankheiten, Rost, Falscher Mehltau: 0,3 % vorbeugend spritzen. Tipp: Alternative Indar 5 EW oder Cuprofix. Rost / Blattflecken (Populus) ab M.Juni behandeln.</p> <p>Falscher Mehltau, Rhododendron-Zweigsterben, Blattflecken: 0,25 % spritzen. Tipp: Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen. Ergänzend mit Cuprofix behandeln. Rhododendron-Zweigsterben und Blattflecken vor und nach Blüte behandeln.</p> <p>Echter Mehltau, Schrotschuss: 0,15 % auf junge Triebe spritzen. Tipp: Für systemische Wirkung Behandlung bei min. 12 °C durchführen. Alternativ mit Indar 5 EW oder Cuprofix behandeln.</p> <p>Miniermotten, Gespinstmotten, Rhododendron-Zikade: 0,5 % spritzen. Tipp: Ab Ende Mai alle 3 Wochen. Wirkt systemisch.</p> <p>Moos und Lebermoos in Kontainerculturen: 0,75 % spritzen. Tipp: Moos und Lebermoose gut benetzen.</p>
			<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Dithane NeoTec</div> <div style="background-color: #D2B48C; padding: 2px;">+ Wuxal Profi</div>				<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Dithane NeoTec</div> <div style="background-color: #D2B48C; padding: 2px;">+ Wuxal Profi</div>					
			<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Touchdown System 4</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">+ Duplosan KV Combi</div>									
			<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Duplosan KV Combi</div> <div style="background-color: #D3D3D3; padding: 2px;">+ Etafix Pro</div>									
			<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Lontrel 100</div> <div style="background-color: #D3D3D3; padding: 2px;">+ Genol Plant</div>									
			<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Dithane NeoTec</div>									
			<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Ridomil Gold</div>									
			<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Nimrod</div>									
			<div style="background-color: #FFDAB9; padding: 2px;">SanoPlant Neem</div>									
							<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Mosotex Profi</div>					

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
													Laubgehölze allgemein
									Goal				Alle Unkräuter: 20 ml/Are in 10 l Wasser gleichmässig spritzen. Tipp: Alle Herbizide mit Kontaktwirkung dürfen nur in gut verholzten Kulturen (ab September) angewendet werden.