

	Stecklingsp.	Bewurzelung	Topfen	Wachstum	Entspitzen	Wachstum	Rücken	Hemmstoff	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	Pelargonium zonale / Pelargonium peltatum					
KW	1	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12	13	14-15	16-17	ab 18	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger
M	A.Jan.	E.Jan	A.Feb.	M.Feb.	E.Feb	A.März	M.März	E.März	A.April	M.April	E.April	A.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp					
		Folpet											Bodenpilze: Folpet DG 150-300 g/m ³ der Erde beimischen. Tipp: Betriebshygiene beginnt beim Erdlager; vor Neubefüllung gründlich reinigen. Erdhaufen mit Folie abdecken.					
		Previcur Energy											Stecklingsfäule, Bodenpilze: 0,15 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy wirkt pflanzenstärkend und erhöht die Resistenz gegenüber Bakteriosen.					
			Sequestrene Rapid										Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.					
			Wuxal Suspension Mg										Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30-50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2-3 mal den Spritzungen beigegeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.					
		NEU	Hicure										Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.					
			Wuxal Profi										Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.					
			Score Profi										Blattfleckenpilze, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.					
			Indar 5 EW										Rost: Indar 0,15 % + Dithane 0,3 % spritzen, nach dem Pikieren. Tipp: Statt Dithane kann auch Tega als Mischpartner verwendet werden.					
			+ Dithane NeoTec															
			Indar 5 EW										Macrosporium: Indar 0,15 % spritzen. Tipp: Behandlung alle 10-14 Tage.					
			Cuprofix Fluid										Bakteriosen: Cuprofix 0,2 % spritzen. Tipp: Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger zumischen vermeidet Flecken auf den Blättern.					
			Cuprofix										Bakteriosen: Cuprofix 0,1 % spritzen. Tipp: Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger zumischen vermeidet Flecken auf den Blättern.					
			Bonzi										Wachstumsregulierung: spritzen je nach Sorte und Wuchskraft, 0,1 % (Sämlinge im Pikierstadium), 0,25 % (Sämlinge im Endtopf), 0,1-0,25 % (vegetativ vermehrte, bei beginnendem Längenwachstum), 0,25-0,5 % (-peltatum Jungpflanzen, Im Endtopf rechtzeitig wiederholen), 0,1 % (-zonale und peltatum, bewurzelte Jungpflanzen, In den lichtarmen Wintermonaten alle 3-4 Wochen wiederholen). Tipp: Führt zu besserer Verzweigung.					

	Stecklingsp.	Bewurzelung	Topfen	Wachstum	Entspitzen	Wachstum	Rücken	Hemmstoff	Wachstum	Knospen	Blühbeginn	Verkauf	Pelargonium zonale / Pelargonium peltatum						
KW	1	3-4	5	6-7	8	9-10	11	12	13	14-15	16-17	ab 18	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
M	A.Jan.	E.Jan	A.Feb.	M.Feb.	E.Feb	A.März	M.März	E.März	A.April	M.April	E.April	A.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
				Vertimec										Spinnmilben, Thrips, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten					
				Zenar										Spinnmilben: Zenar 0,04 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten. Zenar wirkt per Kontakt, deshalb Pflanze gut und allseitig benetzen.					
				Match Profi										Thrips: 0,1 % spritzen, nur unter Glas. Tipp: Thrips abwechselnd mit verschiedenen Wirkstoffen bekämpfen um Resistenzen vorzubeugen.					
				Kendo										Blattläuse, Raupen, Thrips, Weisse Fliegen: 0,01 % spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.					
					Play									Blütenbotrytis: 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Zu feuchte Kulturführung meiden. Für Behandlung Temperatur > 12 °C halten.					
					Mapro									Blütenbotrytis: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen, in Kulturen für Herbstverkauf oder nach dem Auswintern. Tipp: Mapro nicht mit anderen Produkten mischen!					
													Plantomaag N.	Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					
													Plantomaag Mix	Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					