

	Saat	Keimung	Wachstum	Pikieren	Wachstum	Topfen	Wachstum	Knospe	Blühbeginn	Verkauf	Primula vulgaris (Kissenprimel) 9er-Topf						
KW	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
M	A.Juli	M.-E.Juli	A.Aug.	M.Aug.	E.Aug.-M.Sep.	E.Sept.	A.Okt.-M.Jan.	E.Jan.	M.Feb.	E.Feb.-E.März	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
		Sequestrene Rapid					Sequestrene Rapid + Wuxal Profi					<p>Eisenmangel: 100 g/m³ der Pflanz Erde beimischen oder Eisenmangel im Frühjahr, Verbesserung Blattfarbe: Sequestrene 0,2 % + Allgemeine Düngung: Wuxal Profi 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.</p>					
		Previcur Energy										<p>Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen: Previcur 0,15 % giessen, nach dem Pikieren. Tipp: Previcur Energy fördert die Resistenz der Pflanze und hat damit einen präventiven Nebeneffekt auf Bakteriosen.</p>					
		NEU Hicure										<p>Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.</p>					
		Wuxal Profi										<p>Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.</p>					
		Wuxal Suspension Mn										<p>Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.</p>					
		Limax Plus										<p>Schnecken: 20-30 g/m³ spritzen. Tipp: Vorbeugend bei kleiner Pflanze streuen, damit die Schneckenkörner nicht auf den Blättern liegen bleiben.</p>					
		Kendo										<p>Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % + Netzmittel: Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Kendo wirkt als Frass- und Kontaktmittel bereits ab 5 °C.</p>					
		+ Etalfix Pro															
		Match Profi										<p>Thrips: Match 0,1 % (nur unter Glas) + Netzmittel: Etalfix Pro 0,02 % spritzen. Tipp: Match ist bereits ab 5 °C wirksam.</p>					
		+ Etalfix Pro															
		Vertimec										<p>Spinnmilben, Thrips, Minierfliegen: Vertimec 0,025-0,05 % + Weisse Fliegen, Blattläuse: 0,06 % spritzen. Tipp: Für systemische Wirkung Plenum WG auf wüchsige Pflanzen und bei Temperaturen > 12 °C.</p>					
		+ Plenum WG															
		Play										<p>Blütenbotrytis im Winter: Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen. Tipp: Oder Mapro 0,05 % als Alternative gegen Botrytis mit Wirkstoff aus anderer Gruppe.</p>					

	Saat	Keim- ung	Wachs- tum	Pikie- ren	Wachstum	Top- fen	Wachstum	Kno- spe	Blüh- beginn	Verkauf	
KW	1	2-3	4-5	6	7-11	12	13-30	32-33	34-35	36-40	Primula vulgaris (Kissenprimel) 9er-Topf
M	A.Juli	M.-E.Juli	A.Aug.	M.Aug.	E.Aug.-M.Sep.	E.Sept.	A.Okt.-M.Jan.	E.Jan.	M.Feb.	E.Feb.-E.März	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Insektizide Fungizide Herbizide Netzmittel Hemmstoff Dünger </div>
											Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp
											Blütenbotrytis im Winter: Mapro 0,05 % spritzen. Tipp: Oder Play 0,05 % mit systemischem Wirkstoff und Belagswirkstoff aus anderen Gruppen.
											Wachstumsregulierung: 0,03 % spritzen. Tipp: 1. Anwendung sobald getopfte Jungpflanze angewachsen bzw. erste Wurzeln sichtbar sind. 2. Anwendung ca. 10-14 Tage später. Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
											Wachstumsregulierung: 0,25 % spritzen, je nach Sorte und Wuchskraft. Tipp: Auf wüchsige Pflanzen behandeln.
											Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.
											Ramularia-Blattflecken: Indar 0,2 % spritzen. Tipp: Indar ab 12 °C einsetzen. Oder Delan bzw. Dithane NeoTec zum Abwechseln der Wirkstoffgruppen.
											Ramularia-Blattflecken: Delan WG 0,05 % oder Delan 500 SC 0,075 % spritzen. Tipp: Kontaktfungizid bereits ab 5 °C und vorbeugend einsetzen.
											Ramularia-Blattflecken: 0,2 % spritzen. Tipp: Nebeneffekt gegen vereinzelt auftretenden Falschen Mehltau. Wirkt bereits ab 5 °C. Vorbeugend einsetzen.
											Langzeitdünger: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.
											Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.

NEU