

	Winter- ruhe	Rück- schnitt	Antrei- ben	1. Flor	Regen- eration	2. Flor	Regen- eration	3. Flor	Regeneration	4. Flor	Winter- ruhe	Rosa odorata, Schnittkultur Treibhaus								
Monat	KV	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger		
		A.Jan- M.Feb	M.Feb- E.Feb	E.Feb- A.März	M.April	E.April- M.Juni	M.Juni- E.Juni	E.Juni- M.Aug.	M.-E. August	E.Aug.-M.Nov.	M.-E. Nov.	E.Nov.- E.Dez.	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau. Langzeitdünger: Plantomaag Normal: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau. Alle Unkräuter und Ungräser inklusive Wurzelunkäuter: 50 ml/Are spritzen unter Verwendung von Abdriftarmen Düsen und Spritzschirm und bei mindestens 8 °C während 72 h. Einjährige Unkräuter und Ungräser: 20 g/Are spritzen. Tipp: Als Tankmischung mit Molipan Pro hält die Wirkung 2-3 Monate an. Danach auf unkrautfreien Boden Gardenurs. Falscher Mehltau, Rost, Sternrusstau, Blattfleckenpilze: 0,05 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht. Falscher Mehltau, Rost, Sternrusstau, Blattfleckenpilze: 0,075 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht. Echter Mehltau: 0,2 % spritzen. Tipp: Nur vorbeugend einsetzen, regelmässig wiederholen, nicht bei Hitze behandeln, mit Nebenwirkung auf Spinnmilben. Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % + Match 0,2 % in Tankmischung spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann auch mit Play gegen Botrytis kombiniert werden. Thrips, Blattläuse: 0,1 % spritzen. Tipp: Durch seine systemische Wirkung kann der Wirkstoff nach Eindringen nicht mehr abgewaschen werden. Spinnmilben: Zenar 0,04 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten Spinnmilben, Thrips, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen, gegen Weisse Fliegen auf 0,05 % erhöhen, nur unter Glas. Weisse Fliegen, Blattläuse: Plenum 0,04 %. Tipp: Vertimec ab 15 °C, Plenum ab 20 °C. Mischung kann auch gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.							
				Plantomaag Mix 4M / 6M																
				Plantomaag Normal																
				Touchdown System 4 / Roundup Ultra Pro																
				+ Molipan Pro																
			NEU	Delan WG																
				Delan 500 SC																
				Thiovit Jet																
				Kendo																
				+ Match Profi																
				Perfekthion																
				Zenar																
				Vertimec																
				+ Plenum WG																

	Winter- ruhe	Rück- schnitt	Antrei- ben	1. Flor	Regen- eration	2. Flor	Regen- eration	3. Flor	Regeneration	4. Flor	Winter- ruhe	Rosa odorata, Schnittkultur Treibhaus						
Monat	KV											Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger	
	1-7	8	9-14	15-16	17-23	23-24	25-32	33-34	35-44	45-47	48-52							
	A.Jan- M.Feb	M.Feb- E.Feb	E.Feb- A.März	M.April	E.April- M.Juni	M.Juni- E.Juni	E.Juni- M.Aug.	M.-E. August	E.Aug.-M.Nov.	M.-E. Nov.	E.Nov.- E.Dez.							
			Match Profi															
			Fonganil															
			+ Dithane NeoTec															
			Score Profi															
			Ortiva															
			Indar 5 EW															
			+ Dithane NeoTec															
			Nimrod															
			Topas															
			Play															
					Duplosan KV-Combi													
												Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp						
												<p>Thrips: 0,2 % spritzen, nur unter Glas. Tipp: Thrips abwechselnd mit verschiedenen Wirkstoffen (z.B. Vertimec, Kendo) bekämpfen um Resistenzen vorzubeugen.</p>						
												<p>Falscher Mehltau: Fonganil 0,02 % + Dithane 0,3 % spritzen. Tipp: Alternativ kann auch Ridomil Gold verwendet werden.</p>						
												<p>Blattfleckenpilze, Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau: 0,05 % spritzen Tipp: Lokal-systemische Wirkung, abstoppend, sehr verträglich, fleckt nicht.</p>						
												<p>Echter Mehltau, Rost, Falscher Mehltau: 0,1 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht. Wirkstoff verstärkt Blattgrün (Grün-Effekt).</p>						
												<p>Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau: Indar 0,2 % + Dithane 0,3 % spritzen. Tipp: Zur Vermeidung von Resistenbildung durch wiederholte Spritzungen sollten auch andere Wirkstoffe verwendet werden. Z.B. Ortiva oder Delan 500.</p>						
												<p>Echter Mehltau: 0,2 % spritzen. Tipp: Alle 10-14 Tage wiederholen.</p>						
												<p>Echter Mehltau: 0,025 % spritzen. Tipp: Nicht öfter als 4 x pro Saison in gleicher Kultur anwenden. Alle 10-14 Tage wiederholen, mit anderen Wirkstoffen abwechseln.</p>						
												<p>Botrytis: 0,1 % spritzen. Tipp: Während der Blütezeit Dosierung auf 0,05 % reduzieren.</p>						
												<p>Unkräuter: 25 ml/Are spritzen nach Pflanzung. Tipp: Nur für Freilandkultur, geringe Wirkung auf Ackerhellerkraut, Ausfallgetreide, Klebern, Knötericharten, Schaumkraut.</p>						