

	Stecken	Wachstum	weiches Stutzen	Wachstum	Rücken	Wachstum	Knospe	Blühbeginn	Verkauf	Rosa odorata, Topfkultur Treibhaus 10er-Topf, 4-Monats-Kultur, Frühjahr					
W	1	2-4	5	6-12	13	14-15	17	18	19	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger
Σ	A.Jan.	M.Jan.-A.Feb.	M.Feb.	E.Feb.-M.Apr.	M.Apr.	M.Apr.-A.Mai	A.Mai	M.Mai	ab M.Mai	Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp					
	Plantomaag Mix 4M /								Plantomaag Mix	Langzeitdünger: Plantomaag Mix 4M/6M für empfindliche Kulturen 2,5 g/l Substrat, verträgliche Kulturen 3,0 g/l Substrat und bedürftige Kulturen 3,5 g/l Substrat einarbeiten. Tipp: Wirkung 4 M bis 4 und 6M bis 6 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					
	Plantomaag Normal								Plantomaag Normal	Langzeitdünger: Aufdüngung von Topfsubstraten: mässig nährstoffbedürftige Kulturen: 0,75 kg/m ³ , normal nährstoffbedürftige Kulturen: 1,0 kg/m ³ und stark nährstoffbedürftige Kulturen: 1,5–2,0 kg/m ³ . Tipp: Wirkung 2-3 Monate. Dosierung der bisherigen Plantomaag-Dünger finden Sie im Ratgeber Gartenbau.					
	Sequestrene Rapid									Eisenmangel, Verbesserung Blattfarbe: 0,2 % giessen. Tipp: Beim Giessen die Blätter nicht treffen. Benetzte Blätter abwaschen um Verbrennungen zu vermeiden.					
	NEU Hicure									Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern: 0,25 % spritzen oder giessen. Tipp: Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.					
	Wuxal Profi									Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen: 0,2 % giessen oder spritzen. Tipp: Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht die Widerstandskraft.					
	Wuxal Suspension Mg									Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. Tipp: 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in Blüten.					
	Wuxal Suspension Mn									Blattdünger gegen Mangan-Mangel: 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.					
				Bonzi						Wachstumsregulierung: 1-1,5 % spritzen der Topf-Rosen bei 4-5 cm Triebblänge. Tipp: Substrat nach Behandlung gleichmässig feucht halten.					
	Kendo									Blattläuse, Raupen, Thrips: Kendo 0,01 % + Match 0,2 % in Tankmischung spritzen. Tipp: Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann auch gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.					
	+ Match Profi														
	Perfekthion									Thrips, Blattläuse: 0,1 % spritzen. Tipp: Durch seine systemische Wirkung kann der Wirkstoff nach Eindringen nicht mehr abgewaschen werden.					
	Zenar									Spinnmilben: Zenar 0,04 % spritzen. Tipp: Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten					

	Stecken	Wachstum	weiches Stutzen	Wachstum	Rücken	Wachstum	Knospe	Blühbeginn	Verkauf		
		Rosa odorata, Topfkultur Treibhaus 10er-Topf, 4-Monats-Kultur, Frühjahr									
		Vertimec									Spinnmilben, Thrips, Weisse Fliegen: Vertimec 0,025 % spritzen, gegen Weisse Fliegen auf 0,05 % erhöhen, nur unter Glas. Weisse Fliegen, Blattläuse, Weisse Fliegen: Plenum 0,06 %. Tipp: Vertimec ab 15 °C und Plenum ab 20 °C. Mischung kann auch gut mit Play gegen Botrytis kombiniert werden.
		+ Plenum WG									
		Match Profi									Thrips: 0,2 % spritzen, nur unter Glas. Tipp: Thrips abwechselnd mit verschiedenen Wirkstoffen (z.B. Vertimec, Kendo) bekämpfen um Resistenzen vorzubeugen.
		Fonganil									Falscher Mehltau: Fonganil 0,02 % + Dithane 0,3 % spritzen. Tipp: Alternativ kann auch Ridomil Gold verwendet werden.
		+ Dithane NeoTec									
	NEU	Delan WG									Falscher Mehltau, Rost, Sternrusstau, Blattfleckpilze: 0,05 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht.
		Delan 500 SC									Falscher Mehltau, Rost, Sternrusstau, Blattfleckpilze: 0,075 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht.
		Ortiva									Echter Mehltau, Rost, Falscher Mehltau: 0,1 % spritzen. Tipp: Vorbeugend einsetzen wenn Gefahr für Schadpilze besteht. Wirkstoff verstärkt Blattgrün (Grün-Effekt).
		Indar 5 EW									Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau: Indar 0,2 % + Dithane 0,3 % spritzen. Tipp: Zur Vermeidung von Resistenbildung durch wiederholte Spritzungen sollten auch andere Wirkstoffe verwendet werden. Z.B. Ortiva oder Delan 500.
		+ Dithane NeoTec									
		Thiovit Jet									Echter Mehltau: 0,2 % spritzen. Tipp: Regelmässig wiederholen, nicht bei Hitze behandeln. Nebenwirkung auf Spinnmilben.
		Score Profi									Blattfleckpilze, Sternrusstau, Echter Mehltau, Rost: 0,05 % spritzen Tipp: Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, sehr verträglich, fleckt nicht.
		Nimrod									Echter Mehltau: 0,2 % spritzen. Tipp: Alle 10-14 Tage wiederholen.
		Topas									Echter Mehltau: 0,025 % spritzen. Tipp: Nicht öfter als 4 x pro Saison in gleicher Kultur anwenden. Alle 10-14 Tage wiederholen, mit anderen Wirkstoffen abwechseln.
		Play									Botrytis: 0,1 % spritzen. Tipp: Während der Blütezeit Dosierung auf 0,05 % reduzieren.