

	Saat	Keim- ung	Keim- bis 4- Blatt	Pflanzung	Wachstum	Knos- pe	Blühbeginn	Herbst-Verkauf	<b>Viola wittrockiana, Freilandkultur für Herbstverkauf</b>						
KW	1	2	3+4	5	Kulturwoche 6-11	12	13	14-15	15-19	Insektizide	Fungizide	Herbizide	Netzmittel	Hemmstoff	Dünger
M	E.Juni			E.Juli	August - September		E.Sept	A. Okt	A.Okt. A.Nov	<b>Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp</b>					
	Basamid									<b>Bodendesinfektion:</b> Basamid Granulat 4-5 kg/Are gleichmässig streuen und einarbeiten. <b>Tipp:</b> Bodendesinfektion des Saatbeets rechtzeitig planen.					
	Folpet									<b>Bodenplize:</b> Folpet DG 150-300 g/m³ der Erde beimischen. <b>Tipp:</b> Betriebshygiene beginnt beim Erdlager. Dies vor Neubefüllung gründlich reinigen. Erdhaufen mit Folie vollständig abdecken.					
		Previcur Energy + Folpet DG								<b>Vermehrungspilze, Wurzelhalsfäulen:</b> Previcur 0,15 % + Folpet 0,12 % giessen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Previcur Energy hat eine pflanzenstärkende Wirkung und präventiv angewendet einen Nebeneffekt auf Bakteriosen. Previcur Energy nicht auf Blüte.					
			Stomp Aqua						Stomp Aqua	<b>Einjährige Gräser und Unkräuter, ohne Franzosen- und Kreuzkraut:</b> 25 ml/Are spritzen, vor dem Pflanzen. <b>Tipp:</b> Nur für Pflanzung von Topf- und Ballenpflanzen geeignet.					
				Fonganil					Fonganil	<b>Falscher Mehltau und Bodenpilze (Phytophthora, Phytium):</b> 0,01–0,02% spritzen. <b>Tipp:</b> erste Behandlung unmittelbar nach Pflanzung, zweite Behandlung 3 Wochen später. Auf feuchten Ballen giessen, damit der Wirkstoff tief eindringen kann.					
				Indar 5 EW + Dithane NeoTec						<b>Ramularia-Blattflecken:</b> Indar 0,2 % + Dithane NeoTec 0,3 % spritzen, nach dem Pikieren. <b>Tipp:</b> Ridomil Gold statt Dithane wenn Gefahr für Falschen Mehltau gross ist.					
				Score Profi						<b>Blattfleckenpilze, Ramularia, Echter Mehltau:</b> 0,05 % spritzen <b>Tipp:</b> Lokalsystemische Wirkung, abstoppend, Spezialist gegen Blattflecken, sehr verträglich, fleckt nicht.					
				Zenar						<b>Spinnmilben:</b> Zenar 0,04 % spritzen. <b>Tipp:</b> Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten					
				Vertimec						<b>Spinnmilben:</b> Vertimec 0,025 % spritzen. <b>Tipp:</b> Temperaturen für 12 h bei mindestens 12 °C halten					
				Match Profi						<b>Thrips:</b> 0,1 % spritzen, nur unter Glas. <b>Tipp:</b> Thrips abwechselnd mit verschiedenen Wirkstoffen bekämpfen um Resistenzen vorzubeugen.					
				Kendo						<b>Blattläuse, Raupen, Thrips:</b> 0,01 % spritzen. <b>Tipp:</b> Sehr gute Wirkung bereits ab 5 °C. Kann gut mit Play gegen Blütenbotrytis kombiniert werden.					
				Wuxal Suspension Mg						<b>Blattdünger gegen latenten und akuten Magnesium-Mangel:</b> 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. <b>Tipp:</b> 2–3 mal den Spritzungen begeben. Fördert das Blattgrün. Nicht in die Blüten.					
				Wuxal Suspension Mn						<b>Blattdünger gegen Mangan-Mangel:</b> 30–50 ml/10 l Wasser spritzen. 2–3 mal den Spritzungen begeben. Nicht in die Blüten spritzen.					

	Saat	Keim- ung	Keim- bis 4- Blatt	Pflanzung	Wachstum	Knos- pe	Blühbeginn	Herbst-Verkauf	
KW	1	2	3+4	5	Kulturwoche 6-11	12	13	14-15	15-19
M	E.Juni			E.Juli	August - September		E.Sept	A. Okt	A.Okt. A.Nov
			NEU		Hicure				
					Wuxal Profi				
					Indar 5 EW				
					+ Ridomil Gold				
					Cuprofix Fluid				
					Cuprofix				
					Play				

**Viola wittrockiana, Freilandkultur für Herbstverkauf**

**Insektizide** **Fungizide** **Herbizide** **Netzmittel** **Hemmstoff** **Dünger**

**Schaderreger, Dosierung, Anwendung, Tipp**  
**Hochwertiges Biostimulans für stärkeres Wurzelwachstum, höhere Widerstandskraft, Haltbarkeit und Trockentoleranz, erleichtert Nährstoffaufnahme aus Blattdüngern:** 0,25 % spritzen oder giessen. **Tipp:** Die besten Effekte von Hicure werden durch Applikationen vor kritischen Wachstumsphasen (Wurzelentwicklung, Blüteninduktion) oder unter suboptimalen Wachstumsbedingungen (Frost, Trockenstress, Hitze) erzielt. Häufigere Applikationen sind wirkungsvoller als Solo-Applikationen.

**Flüssigdüngung, Blattdünger mit Netzmitteleffekt, mindert Stresssituationen:** 0,2 % giessen oder spritzen. **Tipp:** Als Netzmittel zu Spritzungen zufügen, die gerne Flecken verursachen. Blattdüngung begünstigt Wurzelbildung und erhöht Nährstoffaufnahme.

**Mycocentrospora-Blattflecken, Falscher Mehltau, Ramularia:**  
 Indar 0,15 % + Ridomil 0,25 % spritzen, während Jungpflanzenphase.

**Blattfleckenkrankheiten:** 0,2 % spritzen. Netzmittel Etalfix Pro 0,02 % gegen Spritzflecken zusetzen. **Tipp:** Für alle Pflanzen besser verträglich. Nicht gegen Wände sprühen, färbt.

**Bakteriosen:** Cuprofix 0,2 % spritzen. **Tipp:** Netzmittel Etalfix Pro oder Wuxal Profi Flüssigdünger zumischen vermeidet Flecken auf den Blättern.

**Blütenbotrytis:** Play 0,05 % (= halbe Dosierung!) spritzen, in Kulturen für Herbstverkauf oder nach dem Auswintern.  
**Tipp:** Cuprosan U-DG 0,25 % hat eine Nebenwirkung auf Botrytis.