

Alar® und Bonzi®

| Kultur | Alar® in % | Bonzi® in % | Anwendungszeitpunkt/Wirkung/Bemerkungen |
|--|---------------|----------------|--|
| Achimenes-Hybriden | 0,2 | | Erste Behandlung bei ca. 5 cm Höhe. Rechtzeitig wiederholen. |
| Ageratum | 0,3 | 0,15–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. Unter Hochglas oder Folie, eventuell wiederholen. |
| Allamanda cathartica | 0,25 | | |
| Alonsoa | | 0,1–0,2 | |
| Amaranthus | 0,3 | | |
| Anagallis | 0,3–0,5 | | |
| Anemone spp. | 0,3 | 0,25–0,5 | Wiederholen. |
| Anisodonteia capensis | 0,15–0,25 | | Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen. |
| Anthemis | 0,3 | 0,25 | Bei Beginn des Durchtriebes nach Handstutz. |
| Antirrhinum | | 0,1–0,2 | Eventuell wiederholen. |
| Argyranthemum frutescens (Strauchmargerite) | 0,5 | 0,25–1 | Bei beginnendem Längenwachstum rechtzeitig wiederholen. |
| Topf | 0,2–0,4 | 0,5–1,5 | 5–10 Tage nach dem Stecken, bzw. Topfen. Mehrtrieber, wenn Neutriebe 2–3 cm lang sind. Vor allem bei stark wachsenden Sorten wiederholen. |
| Schnitt | 0,4 | 0,5–1 | Während des Stängelwachstums. |
| normale und gesteuerte Kultur | 0,4 | 1,0–1,5 | Kurzer Blütenhals: sobald Blütenknospen erkennbar. |
| Astern, Asteriscus | 0,3 | | Eventuell wiederholen. |
| Bacopa Satura | 0,3 | | |
| Begonia Elatior und Lorraine | | 0,25–0,5 | Im Schlusstopf nach Durchwurzelung, besonders bei Begonia Lorraine rechtzeitig wiederholen. Kurze Blütenstiele: sobald Blütenknospen sichtbar. |
| Begonia Heterosis Nonstop | | 0,1–0,25 | Beginnender Pflanzenaufbau. |
| Begonia semperflorens | | 0,05–0,15 | Bei Beginn des Längenwachstums. |
| Begonia, Knollen- und Strauchbegonien | | 0,25–0,5 | Mehrmals wiederholen. |
| Bellis | 0,2–0,3 | 0,05–0,25 | Sofort nach dem Anwachsen bei beginnendem Längenwachstum. Bei wüchsigem Wetter rechtzeitig wiederholen. |
| Beioperone guttata | 0,3–0,5 | | Auf 10–12 cm hohe Pflanzen. |
| Bidens | 0,5 | | |
| Bougainvillea-Hybriden | | 0,15–0,25 | 7 Tage nach dem Stutzen. |
| Brachycome | 0,3 | 0,25 | Bei Beginn des Durchtriebes nach Stutzen von Hand. Wiederholen. |
| Brassicaceae (Zierkohl) | Topf | 0,25–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Browallia speciosa | 0,3 | | Auf 8–10 cm hohe Pflanzen. 1 mal wiederholen. |
| Calceolaria-Hybriden | | 0,15–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. Beim Spritzen nur betauen. |
| Calceolaria polyrhiza/rugosa | | 0,15–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. Spritzbehandlungen rechtzeitig wiederholen. |
| Calendula officinalis | 0,2–0,3 | | Auf 10–12 cm hohe Pflanzen. |
| Calibrachoa-Hybriden | 0,3 | | |
| Callistephus | Topf, Schnitt | 0,3–0,5 | Auf 8–10 cm hohe Pflanzen. Rechtzeitig wiederholen. |
| Campanula isophylla | 0,3 | | Bei 8–10 cm Triebhöhe, evtl. wiederholen. |
| Capsicum annuum | 0,3 | 0,25–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum, evtl. wiederholen. |
| Catharanthus roseus | | 0,25–0,5 | Bei Beginn des Pflanzenaufbaus. |
| Celosia argentea | 0,3 | | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Cheiranthus | | 0,15–0,25 | |
| Cineraria | 0,2–0,3 % | | Nach dem Einwurzeln im finalen Topf. |
| Coleus-blumei-Hybriden | 0,3–0,5 | | Auf 6–10 cm hohe Pflanzen. |
| Columnea | 0,2–0,3 | | Zu Beginn des Längenwachstums. |
| Cotoneaster | 0,5 % | | Auf den neuen Austrieb von ca. 3 cm. |
| Cosmea | 0,5 | | |
| Crassula coccinea | | 0,25 | Nach dem Durchwurzeln im Endtopf. |

WACHSTUMSREGULATOREN

| Kultur | | Alar* in % | Bonzi* in % | Anwendungszeitpunkt/Wirkung/Bemerkungen |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|--|
| Crossandra | | 0,2–0,4 | | Zu Beginn des Längenwachstums. |
| Cuphea ignea | | | 0,15–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Dahlia | Topf | 0,3–0,5 | | Auf 5–8 cm hohe Pflanzen, eventuell wiederholen. |
| Dianthus | Topf | | 0,2–0,3 | Nach Durchwurzelung im Endtopf. Rechtzeitig wiederholen. |
| Dicentra spectabilis | Topf | | 0,5–1 | Bei beginnendem Längenwachstum. Efalfix Pro 0,02 % zusetzen. |
| Dimorphotheca | | | 0,3 | |
| Dorotheanthus | | | 0,2 | |
| Dyssodia (Thymophylla tenuiloba) | | 0,3 | 0,25 | Beginn Durchtrieb nach Stutzen von Hand. |
| Erigeron | Topf | 0,3–0,5 | | |
| Euphorbia (Poinsettia pulcherrima) | | | 0,1–0,25 | Feste, farbintensive Brakteen. Bis spätestens Mitte Oktober. |
| | | | 0,1 | Zur Zeit der Brakteenausbildung sauberes (Regen-) Wasser verwenden. |
| Eustoma grandiflorum | | | 0,25–0,5 | Topfkultur. Rechtzeitig beginnen. Blaue: niedere Dosierung, weisse: höhere Dosierung. |
| Exacum affine | | 0,1–0,2 | | Bei beginnendem Längenwachstum wiederholen. |
| Felicia | | 0,3–0,5 | | |
| Forsythia | | 0,5 | 0,6 | Seitentriebe mit einem guten Blütenknospenansatz. |
| Fuchsia spp. | | | 0,5–0,6 | Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen. Bessere Verzweigung, mehr Seitentriebe. |
| Gazania | | 0,3–0,5 | | Auf 8–10 cm hohe Pflanzen. Im Endtopf rechtzeitig wiederholen. |
| Gerbera | Topf | | 0,3 | Blütenknospen gerade sichtbar. Wiederholen. |
| Gnaphalium | | | 0,25–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum. Nur betauen |
| Gomphrena globosa | Topf | | 0,25–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum. Wiederholen. |
| Grevillea | | 0,3 | | Auf 10–12 cm hohe Pflanzen. |
| Helianthus | | 0,4–0,5 | | |
| Heliotropium | | | 0,25 | Nach Durchwurzelung im Endtopf. Rechtzeitig wiederholen. |
| Hibiscus | | | 0,1–0,2 | Bei Beginn des Durchtriebes, eventuell wiederholen. |
| Hydrangea (Rohware) | | 0,2–0,4 | 0,5–1,0 | Wenn Triebe 5–7 cm lang, evtl. wiederholen. |
| Hydrangea (Treiberei) | | 0,4 | 0,5–1,0 | Bei beginnendem Längenwachstum, nach Bildung des 3. oder 4. Blattpaars. |
| Hypoestes phyllostachya | | | 0,15–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Impatiens-Neu-Guinea-Hybriden | | 0,3 | 0,15–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Impatiens walleriana | | 0,3 | 0,1–0,15 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Iresine | | 0,3 | | |
| Kalanchoe-Hybriden | | 0,3–0,5 | 0,05–0,2 | Bei beginnendem Längenwachstum. Kurze Blütenstiele. Stark wachsende Sorten Bonzi 0,2 %, wenn Blütenstiele 1–1,5 cm lang sind. |
| Lantana camara | | | 0,25–0,5 | Wüchsige Jungpflanzen ungestützt oder auf 6 cm lange Triebe nach dem Pinzieren. Spritzbehandlung wiederholen. |
| Lavatera trimestris | | | 0,15–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Leonotis leonurus | | | 0,15–0,25 | Nach Durchwurzelung im Endtopf, eventuell wiederholen. |
| Lilium | Topf | | 0,2–0,3 | Bei 8–10 cm Triebhöhe. Nach Durchwurzelung 1–2 mal wiederholen. |
| Lobelia | | 0,3–0,5 | | Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen. |
| Matthiola (Levkoje) | | | 0,2–0,3 | Eventuell wiederholen. |
| Mesembryanthemum | | 0,2 | 0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Million Beils | | 0,4 | 0,25 | Nach dem Pinzieren auf ca. 1–2 cm hohe Pflanzen. |
| Mimulus | | | 0,1–0,2 | |
| Myosotis | | 0,2–0,3 | | |
| Nemesia | | | 0,1–0,2 | |
| Nicotiana affinis | | 0,3 | 0,25 | |
| Nierembergia hippomanica | | 0,3 | | |
| Oxalis deppei | | | 0,2–0,3 | Kompakte, standfeste Pflanzen. Wenn Blätter schieben. In Abständen von 6–10 Tagen wiederholen. |
| Papaver | | 0,3 | 0,25–0,5 | Spätestens zu Beginn des Blütenknospenansatzes. |

| Kultur | | Alar* in % | Bonzi* in % | Anwendungszeitpunkt/Wirkung/Bemerkungen |
|---|------------------------------------|---------------|----------------|---|
| Pelargonium zonale | Pikierstadium | | 0,1 | Sämlinge von F1-Hybriden |
| | Endtopf | | 0,25 | |
| Pelargonium zonale, -peltatum, vegetativ vermehrte Pflanzen | | | | Für bessere Verzweigung. |
| | Bewurzelte Jungpflanzen im Endtopf | | 0,25–0,5 | Pelargonium peltatum. Rechtzeitig wiederholen. |
| | Lichtarme Wintermonate | | 0,1 | Pelargonium zonale/peltatum. Alle 3–4 Wochen wiederholen. |
| | Beginn Längenwachstum | | 0,1–0,25 | Pelargonium zonale/peltatum. |
| Pentas | | | 0,15–0,25 | Im Endtopf nach Durchwurzelung bei 8–10 cm langen Trieben. Evtl. wiederh. |
| Petunia | | 0,3 | 0,1–0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen. |
| Plectranthus | | 0,3 | 0,25 | Bei Austrieb nach Handstutz. |
| Plumbago | | 0,3 | | |
| Primula acaulis/polyantha | | 0,3 | 0,25 | Im Endtopf; vor allem bei Hauskulturen. |
| Ranunculus | Topf | 0,3 | 0,25–0,5 | Wiederholen. |
| Rhododendron-Simsii-Hybriden (Azalee) | | 0,3–0,4 | 2–3 | Triebabschluss und gleichmässiger Knospenansatz. Alar: frühe Sorten 1. Julihälfte, mittelfrühe 2. Julihälfte, späte Sorten bis Anfang August, 1 l Brühe auf 6–7 m ² . Bonzi: 1–2 Wochen später, 15 l/Are. |
| Rosa | Topf | | 1–1,5 | 1. Behandlung bei 4–5 cm Trieblänge. Gut feucht halten. |
| Saintpaulia und Streptocarpus | | 0,3 | | Kurze Blatt- und Blütenstiele. Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Sanvitalia | | 0,3 | | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Scaevola | | | 0,25 | |
| Schizanthus-wisetonensis- Hybriden | | 0,3 | 0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Senecio (Cineraria-Hybriden) | | 0,3 | 0,25–0,5 | Nach Durchwurzelung im Endtopf. Wiederholen. |
| Senecio (Cineraria maritima) | | 0,2 | 0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum. |
| Sinningia (Gloxinia) | | 0,2 | | Nach Durchwurzelung im Endtopf. Maximal 10 l Brühe/100 m ² . |
| Solanum | | 0,3 | 0,25–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum. Wiederholen. |
| Solanum (Ziertomate) | | 0,3 | | |
| Surfinia | | 0,3–0,5 | 0,25–0,5 | Wiederholen. |
| Tagetes | | 0,3 | 0,25 | Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen. |
| Tibouchina | | 0,3 | | Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen. |
| Torenia | | 0,3 | | Eventuell wiederholen. |
| Trachelium | Topf | 0,3 | | Endtopf. Wiederholen. |
| Tradescantia | | | 0,15 | |
| Verbena-Hybriden | | 0,3 | 0,25–0,5 | Bei beginnendem Längenwachstum, eventuell wiederholen. |
| Viola-wittrockiana-Hybriden (Pensees) | | 0,1–0,5 | | Grössere Frostresistenz. Sofort nach dem Anwachsen bei beginnendem Längenwachstum. Bei wüchsigem Wetter rechtzeitig wiederholen. |
| | | 0,5 | | |
| | Gefässkulturen | | 0,05–0,25 | |
| Zinnia elegans | | 0,3 | | Bei beginnendem Längenwachstum. 1 mal wiederholen. |